

Порядок применения «АктивМ»

Показания к применению

«АктивМ» используется для поддержания снабжения питательными веществами животных, организм которых ослаблен после отела, весь период лактации в следствии нарушения обмена веществ.

Порядок и условия применения

«АктивМ» предназначен как для отдельного кормления, так и в полнормешанном рационе из расчета:

Родильное отделение, новотел-транзит. В зависимости от количества дней нахождения животных в отдельной новотельной транзитной группе:

Новотел 0-5 дней 700г/гол/сутки

Новотел 0-10 дней 500г/гол/сутки

Новотел 0-20 дней 450г/гол/сутки

Новотел 0-30 дней 400г/гол/сутки

Новотел 0-40 дней 350г/гол/сутки

По остальным лактационным периодам:

До 100 дней в лактации 270 - 300г/гол/сутки

От 100 до 200 дней в лактации 180 – 220г/гол/сутки

От 200 до 250 дней в лактации 150 – 170г/гол/сутки

Сухостой фаза №1

70 -100г/гол/сутки

Сухостой фаза №2

200 – 280г/гол/сутки

Тёлки предслучного возраста:

80 – 120г/гол/сутки

Нетели:

100-120г/гол/сутки

Индивидуальная выпойка при инсулинорезистентности

В отдельных случаях (гипергликемия - инсулинорезистентность - слишком высокая концентрация глюкозы в крови, выше нормы на 10% и более, как следствие повышение кетоновых тел), выпойка назначается по следующей схеме:

- Шаг1: проверить уровень глюкозы, залить 400-600г АктивМ, кальция хлорид внутривенно.
- Шаг2: через два часа проверить уровень глюкозы, залить 400-600г АктивМ. Независимо от положительного результата, продолжить пероральную терапию!
- Шаг3: через два часа проверить уровень глюкозы, залить 400-600г АктивМ (ввести данные в журнал)

В зависимости от состояния животного, можно продолжить процедуру в течении 2-3-5 дней.

Цель частого замера глюкозы крови, отследить влияние пропионата хрома на динамику усвоения глюкозы клетками и состояние животного. Цель частой выпойки, способствовать усваиванию глюкозы клетками, восстановлению положительного энергетического баланса, как следствие увеличение потребления СВ, понижения уровня кетоновых тел в крови.

Индивидуальная выпойка при низком уровне глюкозы в крови

В отдельных случаях (гипогликемия - слишком низкая концентрация глюкозы в крови, ниже нормы на 10% и более, как следствие повышение кетоновых тел), выпойка назначается по следующей схеме:

- Шаг1: проверить уровень глюкозы, залить 300-500г АктивМ
- Шаг2: через два часа проверить уровень глюкозы, залить 300-500г АктивМ
- Шаг3: при положительном результате, можно продолжить разовую выпойку в течении 2-3 дней для закрепления результатов.