



УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора

ВЛАСОВ Н.А.

06 СЕН 2019

ИНСТРУКЦИЯ

по применению ОМЭК - Мп для производства премиксов и комбикормов с целью обогащения рационов сельскохозяйственных животных, в том числе птиц, марганцем

(организация - производитель: АО «Биоамид», г. Саратов)

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. ОМЭК - Мп (ОМЕС - Мп) – кормовая добавка, предназначенная для производства премиксов и комбикормов с целью обогащения рационов сельскохозяйственных животных, в том числе птиц, марганцем.

2. ОМЭК - Мп содержит аспарагината марганца 70-75 %, натрия или аммония сернокислого до 100 %. Гарантируемое содержание марганца от 105 до 119 г/кг, натрия или аммония сернокислого от 250 до 300 г/кг.

Не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов.

3. ОМЭК - Мп представляет собой порошок светло-бежевого цвета без запаха, растворимый в воде.

4. Выпускается ОМЭК - Мп расфасованным по 5,0; 10,0; и 25,0 кг в полиэтиленовые мешки, вложенные в полипропиленовые мешки. Внутренние мешки заварены, внешние мешки прошиты синтетическими нитками.

Каждую упаковку маркируют с указанием: наименования организации-производителя, ее товарного знака и адреса, названия кормовой добавки, её назначения, способа применения, массы нетто, состава и гарантируемых показателей, номера партии, даты изготовления, срока и условий хранения, информации о подтверждении соответствия, обозначения СТО, номера государственной регистрации, надписи «Для животных» и снабжают инструкцией по применению.

Хранят в защищенном от попадания влаги сухом помещении на поддонах не более чем в шесть рядов при температуре от 10°C до 30°C при влажности воздуха 50%.

Срок хранения - 12 месяцев с даты изготовления.

Нельзя использовать по истечении срока хранения.

II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

5. Кормовая добавка ОМЭК - Мп является источником биодоступного марганца. Марганец стимулирует синтез холестерина и жирных кислот, проявляя липотропное действие. Он способствует кроветворению, укрепляет скорлупу яиц птиц, улучшает состояние эмбрионов, способствует усвоению жира и белка, оказывает дезинфицирующее действие в желудочно-кишечном тракте, способствует функционированию желез внутренней секреции. Дефицит марганца приводит к уменьшению числа островков Лангерганса в поджелудочной железе и ухудшению усвоения глюкозы.

6. Введение добавки в комбикорма и премиксы для животных способствуют повышению приростов молодняка, продуктивности взрослого поголовья.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

7. ОМЭК - Мп применяют для производства премиксов и комбикормов с целью обогащения

рационов сельскохозяйственных животных, в том числе птиц, марганцем.

8. Кормовую добавку используют совместно с кормами в составе микроэлементных минеральных добавок в количестве 5-10% от существующих норм содержания марганца в типовых рецептурах за счет высокой биологической активности данной органической формы марганца. Вводят в корма и премиксы с учетом содержания марганца в кормах и нормами кормления сельскохозяйственных животных.

9. ОМЭК - Мп вводят в корма (премиксы или комбикорма) на комбикормовых и премиксных заводах, в кормоцехах хозяйств, используя существующие технологии смешивания.

Нормы ввода марганца рассчитывают по формуле с учетом содержания марганца в ОМЭК – Мп:

Назначение	Норма ввода марганца, г/т комбикорма	Норма ввода добавки ОМЭК — Мп, г/т комбикорма
Крупный рогатый скот	$2,35 \div 4,0$	$(2,35 \div 4,0) * 100/C^*$
Свиньи	$3,0 \div 4,0$	$(3,0 \div 4,0) * 100/ C^*$
Сельскохозяйственная птица	$5,0 \div 9,6$	$(5,0 \div 9,6) * 100/C^*$

*С — процентное содержание марганца в кормовой добавке

10. Побочных явлений и осложнений при применении кормовой добавки в соответствии с инструкцией не выявлено. Противопоказаний не установлено.

11. ОМЭК – Мп совместим со всеми ингредиентами корма, другими кормовыми добавками и лекарственными препаратами.

12. Продукцию от животных и сельскохозяйственной птицы после применения ОМЭК - Мп можно использовать в пищевых целях без ограничений.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

13. При работе с ОМЭК - Мп следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками. При случайном попадании кормовой добавки на кожу, в глаза, рот, нос нужно обильно промыть водой.

14. Хранить в местах, не доступных для детей.

Наименование и адрес организации разработчика: АО «Биоамид» Саратов, 410033, ул. Международная, д. 27

Наименование и адрес организации производителя: АО «Биоамид» Саратов, 410033, ул. Международная, д. 27

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению кормовой добавки ОМЭК - Мп, утвержденная Россельхознадзором 14 июля 2017 г.

Регистрационный номер: ПВР-2-6.0/025-91