



ВЛАСОВ Н.А.
04 СЕН 2019

ИНСТРУКЦИЯ

по применению «ОМЭК – Со» для производства премиксов и комбикормов с целью обогащения рационов сельскохозяйственных животных, в том числе птиц, кобальтом

(организация - производитель: АО «Биоамид», г. Саратов)

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. «ОМЭК – Со» («ОМЕС – Со») – кормовая добавка, предназначенная для производства премиксов и комбикормов с целью обогащения рационов сельскохозяйственных животных, в том числе птиц, кобальтом.
2. «ОМЭК – Со» содержит: аспарагината кобальта 70-75%, натрия или аммония сернокислого до 100 %. Гарантируемое содержание кобальта от 110 до 125 г/кг, натрия или аммония сернокислого от 250 до 300 г/кг.

Не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов.

3. «ОМЭК – Со» представляет собой порошок сиреневого цвета без запаха, растворимый в воде.
4. Выпускают расфасованным по 5,0; 10,0; 25,0 кг в полиэтиленовые мешки, вложенные в полипропиленовые мешки. Внутренние мешки заварены, внешние мешки прошиты синтетическими нитками.

Каждую упаковку маркируют с указанием: наименования организации-производителя, ее товарного знака и адреса, названия кормовой добавки, её назначения, способа применения, массы нетто, состава и гарантируемых показателей, номера партии, даты изготовления, срока и условий хранения, информации о подтверждении соответствия, обозначения СТО, номера государственной регистрации, надписи «Для животных» и снабжают инструкцией по применению.

Хранят в защищенном от попадания влаги сухом помещении на поддонах не более чем в шесть рядов при температуре от 10°C до 30°C при влажности воздуха 50%.

Срок хранения - 12 месяцев с даты изготовления.

Нельзя использовать по истечении срока хранения.

II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

5. Кормовая добавка «ОМЭК – Со» является источником биодоступного кобальта. Кобальт стимулирует эритропоэз, улучшает использование железа для синтеза гемоглобина, активирует ферменты: каталазу, аргиназу, фосфатазу. Кобальт необходим для образования витамина B12, способствует усвоению организмом витаминов А, Е, С, угнетает деятельность ряда патогенных микроорганизмов в пищеварительном тракте, увеличивает синтез мышечных белков, повышает гликолитическую активность крови и половую активность самцов, стимулирует белковый обмен.

6. Введение добавки в комбикорма и премиксы для животных способствуют повышению приростов молодняка, продуктивности взрослого поголовья.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

7. «ОМЭК – Со» применяют для производства премиксов и комбикормов с целью обогащения

рационов сельскохозяйственных животных, в том числе птиц, кобальтом.

8. Кормовую добавку используют совместно с кормами в составе микроэлементных минеральных добавок в количестве 5-10% от существующих норм содержания кобальта в типовых рецептурах за счет высокой биологической активности данной органической формы кобальта. Вводят в корма и премиксы с учетом содержания кобальта в кормах и нормами кормления сельскохозяйственных животных.

9. «ОМЭК-Со» вводят в корма (премиксы или комбикорма) на комбикормовых и премиксных заводах, в кормоцехах хозяйств, используя существующие технологии смешивания.

Нормы ввода добавки рассчитывают по формуле с учетом содержания кобальта в «ОМЭК – Со»:

Вид животных	Норма ввода кобальта, г/т комбикорма	Норма ввода «ОМЭК — Со», г/т комбикорма
Крупный рогатый скот	$0,15 \div 0,26$	$(0,15 \div 0,26) * 100/C^*$
Свиньи	$0,075 \div 0,2$	$(0,075 \div 0,2) * 100/ C^*$,
Сельскохозяйственная птица	$0,02 \div 0,07$	$(0,02 \div 0,07) * 100/C^*$

*С – процентное содержание кобальта в кормовой добавке.

10. Побочных явлений и осложнений при применении кормовой добавки в соответствии с инструкцией не выявлено. Противопоказаний не установлено.

11. Кормовая добавка совместима со всеми ингредиентами корма, другими кормовыми добавками и лекарственными препаратами.

12. Продукцию животноводства и птицеводства после применения «ОМЭК – Со» можно использовать в пищевых целях без ограничений.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

13. При работе с «ОМЭК – Со» следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками. При случайном попадании кормовой добавки на кожу, в глаза, рот, нос нужно обильно промыть водой.

14. Хранить в местах, не доступных для детей.

Наименование и адрес организации разработчика: АО «Биоамид» Саратов, 410033, ул. Международная, д. 27

Наименование и адрес организации производителя: АО «Биоамид» Саратов, 410033, ул. Международная, д. 27

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению кормовой добавки ОМЭК - Со, утвержденная Россельхознадзором 19 мая 2017 г.

Регистрационный номер: ПВР-2-6.0/02593