



ВЛАСОВ Н.А.
19 ИЮА 2017

ИНСТРУКЦИЯ

по применению ОМЭК - J для производства премиксов и комбикормов для сельскохозяйственных животных, в том числе птиц

(организация - производитель: АО «Биоамид» , г. Саратов)

I. Общие сведения

1. ОМЭК - J (ОМЕС - J) – кормовая добавка, предназначенная для производства премиксов и комбикормов для сельскохозяйственных животных, в том числе птиц.

2. ОМЭК - J содержит хлебопекарные дрожжи в качестве основы и химически связанный с белковой частью хлебопекарных дрожжей йод. В 1 кг кормовой добавки содержится йода не менее 18 г.

Не содержит генно-инженерно-модифицированных продуктов.

3. ОМЭК - J представляет собой порошок от светло-желтого до бежевого цвета со слабым характерным запахом, хорошо смачивающийся водой. При смешивании с водой образует суспензию. При нагревании до 100°C не теряет йод.

4. Выпускается ОМЭК - J расфасованным по 0,5; 1,0; кг в полиэтиленовые или полистирольные мешки, по 5,0; 10,0; 20,0 кг в полиэтиленовые мешки, вложенные в полипропиленовые или бумажные многослойные мешки. Полиэтиленовые мешки заварены, внешние мешки прошиты синтетическими нитками.

Каждую единицу фасовки маркируют с указанием: наименования организации-производителя, её адреса и товарного знака, названия, назначения и способа применения кормовой добавки, состава и гарантированных показателей, обозначения стандарта организации, знака соответствия и манипуляционного знака «Беречь от влаги», надписи «Для животных», номера партии, регистрационного номера, даты изготовления, срока и условий хранения, массы нетто и снабжают инструкцией по применению.

Хранят в защищенном от попадания влаги сухом помещении на поддонах не более чем в шесть рядов при температуре от 10°C до 25°C при влажности воздуха до 70%.

Срок хранения - 12 месяцев с даты изготовления.

Нельзя использовать по истечении срока хранения.

II. Биологические свойства

5. Кормовая добавка ОМЭК - J является источником биодоступного йода. Йод стимулирует биохимические реакции во всех клетках органов и тканей. Он способствует кроветворению, укрепляет скорлупу яиц птиц, улучшает состояние эмбрионов, способствует усвоению жира и белка, оказывает дезинфицирующее действие в желудочно-кишечном тракте, способствует функционированию желез внутренней секреции. Дефицит йода приводит к снижению продуктивности, отрицательно влияет на воспроизводство потомства. Кормовая добавка относится к четвертому классу токсичности – малоопасные вещества по ГОСТ 12.1.007-76.

III. Порядок применения

7. ОМЭК - J применяют для производства премиксов и комбикормов для сельскохозяйственных животных, в том числе птиц. Кормовую добавку используют

совместно с кормами в составе микроэлементных минеральных добавок взамен неорганических соединений йода, либо совместно в количествах, указанных в таблице 1.

7. ОМЭК - J вводят в корма (премиксы или комбикорма) на комбикормовых и премиксных заводах, в кормоцехах хозяйств, используя существующие технологии смешивания.

Нормы ввода йода рассчитывают по формуле с учетом содержания йода в ОМЭК - J (табл.1).

Таблица 1

Назначение	Норма ввода йода в виде ОМЭК-J взамен неорганического йода г/т комбикорма	Норма ввода йода в виде ОМЭК-J в качестве добавки к основному рациону по неорганическому йоду г/т комбикорма
Сельскохозяйственные животные		
-высокопродуктивные коровы	-	0,5
-поросята отъемыши	1,0	-
-свиньи на откорме	-	0,1
	0,5	-
Сельскохозяйственная птица		
-бройлеры	0,06 — 0,1	-
-куры - несушки	0,1 — 0,27	-

Норма ввода ОМЭК- J рассчитывают: **норма ввода йода(г/т) x 100/С**

С — процентное содержание йода в ОМЭК- J по паспорту качества

8. Побочных явлений и осложнений при применении кормовой добавки в соответствии с инструкцией не выявлено. Противопоказаний для применения не установлено

9. ОМЭК – J совместим со всеми ингредиентами кормов, другими кормовыми добавками и лекарственными средствами.

10. Продукцию от животных и сельскохозяйственной птицы после применения ОМЭК - J можно использовать в пищевых целях без ограничений.

IV. Меры личной профилактики

11. При работе с ОМЭК - J следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками. При попадании ОМЭК - J в глаза, нос или рот промыть обильно водой, специальных лечебных средств не требуется.

12. Хранить в местах, не доступных для детей.

Инструкция разработана АО «Биоамид» совместно с ГНУ ВНИТИП Россельхозакадемии (г. Сергиев Посад) и ФГОУ ВПО «Саратовский ГАУ».

(Адрес организации — производителя: Саратов, 410033, ул. Международная, д. 27.)

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция, утвержденная Россельхознадзором 19 марта 2015 г.

Регистрационный номер: ПВР-2-1.15/03119